

Las principales aves residentes

En esta guía de campo se muestran las 45 especies residentes principales que habitan o realizan todo su ciclo vital en los diferentes hábitats que comprenden Los Pantanos de Villa. Así como varias aves que viven en zonas aledañas y que de alguna manera están relacionadas con este importante humedal.

El objetivo es que, a través de las imágenes que muestran las características de cada ave, cualquier persona pueda tener un material de fácil uso para poder identificarlas y apreciarlas mejor.

Al observar las aves en el campo, nos daremos cuenta que muchas de las especies tienen diferencias entre ambos sexos en la apariencia externa, siendo por lo general el macho más colorido o llamativo. También en sus diferentes periodos de edad y época reproductiva, las aves pueden mostrar diferentes plumajes. Por ello, en las fotografías indicamos a los machos y en los casos necesarios también señalamos las diferencias de plumajes (♀: hembra, Juv.: Juvenil, Adt.: Adulto).


Las especies están agrupadas en familias y, como indicamos, pertenecen al grupo de las aves residentes (las que podemos ver en cualquier época del año).

Esta guía puede ser usada en los diferentes humedales que existen en la costa central del Perú. Forma parte del trabajo conjunto del personal de PROHVILLA con Alejandro Tello, con el fin de difundir la biodiversidad que existe en el Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa, y también motivar el conocimiento y valoración de sus habitantes silvestres, en este caso los más variados y llamativos: las AVES.


Agradecemos el apoyo de las siguientes personas que aportaron con fotografías para la cartilla: Shirley Freyre, Alejandro Tello, Jorge Ubillas, Alejandro Cotillo, David Belmonte, Eddy Díaz, Roger Espinoza, Jaime Talavera, Ricardo Carrillo


Av. Hernando Lavalle s/n - Chorrillos

pantanosdevilla@prohvilla.gob.pe

 [prohvillaoficial](#)

 [pantanosdevillaoficial](#)

 987 666 656

 (01) 719 5797



Huaco de corona amarilla
Yellow-crowned Night-Heron
Nyctanassa violacea

TL, L, JL
56-61 cm

Garza mediana con la corona amarilla y el rostro oscuro.

Garcita estriada
Striated Heron
Butorides striata

TL, L, JL, CD
38-43 cm

Garcita pequeña grisácea con corona azul metálico, presenta estrías largas en el pecho de colores marrón.



Garcita bueyera
Cattle Egret
Bubulcus ibis

TL, G, CD
47-52 cm

Cuello y pico más cortos que las otras garzas blancas. En la época reproductiva algunas plumas se tornan de color ocre-rojizo.

Garza grande
Great Egret
Ardea alba

L, PY, TL, CD
91.5-99 cm

Es la garza blanca más grande, con el pico amarillo y las patas largas, delgadas y negras.



Garcita blanca
Snowy Egret
Egretta thula

L, PY, TL, CD, G
53.5-63.5 cm

Garza blanca pequeña con pico negro, tarsos negros y dedos color amarillo.



Garcita azul
Little Blue Heron
Egretta caerulea


L, PY, TL, CD, G
56-66 cm

Adt. Cuerpo azul con tonos morados, pico gris y negro. **Juv.** Cuerpo blanco, similar a la garza blanca chica, pero con los tarsos verdosos.

Ibis de la puna
Puna ibis
Plegadis ridgwayi

L, TL, PY, G
60-61 cm

De color negro con alas verde metálico, patas largas y un pico rosáceo curvo.



Gallinazo de cabeza negra
Black Vulture
Coragyps atratus

ZA, PY, ZI
60-65 cm

Ave grande completamente oscura con la cabeza desnuda.

Gavilán acanelado
Harris's (Bay-winged) Hawk
Parabuteo unicinctus

ZA, ZI
48-54 cm

Es de color marrón con hombros y muslos rojizos, cola negra con base y fina banda terminal blancas. **Juv.** con el vientre claro amarillento con machas oscuras.



Lechuza terrestre
Burrowing Owl
Athene cunicularia

ZI
21-24 cm

Tiene patas largas y fuertes y grandes ojos amarillos. El color de su plumaje se mimetiza muy bien con el suelo del desierto.



Cernícalo americano
American Kestrel
Falco sparverius


ZA, ZI
27-30 cm

Hembra: Marrón rojiza, no tiene las alas azules. Cola con barras transversales negras. Emite un "kili-kili-kili" rápido y agudo.

Junquero o totorero
Wren-like Rushbird
Phleocryptes melanops

TL, JL
13.5-14 cm

Es de color marrón con banda ferruginosa en el ala y ceja blancuzca. Aconstumbrada a pararse con las patas entre dos ramas de totora.



Turtupilín
Vermilion Flycatcher
Pyrocephalus rubinus

ZA, TL
14.5-15 cm

Hembra: Con la garganta clara, vientre menos rojizo y estriado. Emite un trino característico, de donde proviene su nombre común.

Siete colores de la totora
Many-colored Rush Tyrant
Tachuris rubrigastra

TL, JL
10.5 cm

Pequeño, brillantemente coloreado, confinado a juncales y totorales.



Golondrina azul y blanca
Blue-and-white Swallow
Pygochelidon cyanoleuca

ZI, CD, G, L, JL
11-12 cm

Golondrina con sus coberturas alares de color oscuro o gris. Plumaje de adultos blanco por debajo y negro en la parte dorsal.



Cachirla peruana
Peruvian Pipit
Anthus peruvianus

G, ZI, TL
13-14 cm

Color amarillento claro en las partes inferiores y cola con bordes blancos (evidente en vuelo). Casi siempre se le observa caminando a ras del suelo.

Pastorero peruano/huanchaco
Peruvian Meadowlark
Leistes bellicosus

G, TL, JL
20.5 cm

Hembra y Juv. No tienen el plumaje rojo tan extenso y evidente, pero muestran la característica superciliar blanca.



Tordo de matorral
Scrub Blackbird
Dives warszewiczi



ZA
22 cm

Plumaje totalmente negro y cola larga. Posee un canto melódico que emite inclinando el cuerpo y apuntando el cielo con el pico.

Tordo de capucha amarilla
Yellow-hooded Blackbird
Chrysomus icterocephalus

TL, G, JL
17-18 cm

Hembra: De color oliva oscuro con amarillo brillante en el pecho.



Chirigüe común/triguero
Grassland Yellow-Finch
Sicalis luteola


TL, JL, G
12-13 cm

Hembra: Tiene la garganta y pecho con tonos marrones. Suele verse en grupos y al volar suele emitir unos "chip p" espaciados.



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

AVES RESIDENTES DE PANTANOS DE VILLA Y ALREDEDORES



PROHVILLA
Autoridad Municipal de
LOS PANTANOS DE VILLA

Plantilla de interpretación:



Nombre común
Nombre inglés
Nombre científico
Hábitat
Tamaño

Leyendas de los Hábitats

L: Lagunas y Espejos de Agua
TL: Totoral
ZA: Zona Arbustiva
JL: Juncal - Vega Ciperácea
G: Gramadal

CD: Canales y Drenes
PY: Playa
ZI: Zona Intervenida
M: Mar


*Especies con dimorfismo sexual, presenta foto de acuerdo al símbolo y la descripción del sexo opuesto y/o juvenil.



Identifica la familia por el color

- Anatidae Patos
- Podicipedidae Zambullidores
- Columbidae Palomas y tórtolas
- Rallidae Pollas de agua y gallinetas
- Cuculidae Cuculillos
- Charadriidae Chorlos
- Haematopodidae Ostreros
- Recurvirostridae Cigüeñuelas
- Burhinidae Alcaravanes
- Laridae Gaviotas y gaviotines
- Sulidae Piqueros
- Phalacrocoracidae Cormoranes
- Pelecanidae Pelicanos
- Ardeidae Garzas
- Thresionithidae Ibis
- Cathartidae Gallinazos
- Accipitridae Aguilucho
- Strigidae Lechuzas
- Falconidae Halcones
- Furnariidae Furnáridos
- Tyrannidae Atrapamoscas
- Hirundinidae Golondrinas
- Motacillidae Cachirlas
- Icteridae Tordos


Thraupidae Tangaras y espigueros



Pato colorado
 Cinnamon Teal
Spatula cyanoptera

L, TL
 38-48 cm

Hembra: Con ojos oscuros, cuerpo marrón claro y marcas blancas muy vistosas en las plumas.



Pato gargantillo
 White-cheeked Pintail
Anas bahamensis

L, TL
 44-47 cm

Pato con mejillas, garganta y cola blancas que contrastan con su cuerpo marrón. El pico es negro con los lados rojos en la base.



Pato rana
 Ruddy Duck
Oxyura jamaicensis

L, TL
 42-48 cm

Hembra: de cuerpo pardo claro y pico oscuro.



Zambullidor pimpollo
 White-tufted Grebe
Rollandia rolland

L, TL
 26 cm

Zambullidor pequeño y oscuro, con un parche blanco en ambos lados de la cara.



Zambullidor de pico grueso
 Pied-billed Grebe
Podilymbus podiceps

L, TL
 28-33 cm


Adt. cuerpo café grisáceo, de pico blanco robusto con anillo negro a su alrededor. **Juv.** no tiene la banda negra en el pico.



Zambullidor grande
 Great Grebe
Podiceps major

L, TL
 70-78 cm

Con cuello y pico largos. Suele mostrar un penacho de color oscuro.



Cuculí
 West Peruvian Dove
Zenaida meloda

ZA, ZI
 28.5-31 cm

Tiene franja blanca en el ala, evidente en vuelo. Con anillo ocular azul. Emite notas melódicas "uuuuu," que originan su nombre.



Tórtola orejuda
 Eared Dove
Zenaida auriculata

ZA, ZI
 25.5-26 cm

Con marcas negras en la zona auricular y en las alas. El macho presenta una corona azulada.



Rascón plumizo
 Plumbeous Rail
Pardirallus sanguinolentus

L, TL, JL
 28-30 cm

Pico largo de color verdoso y ligeramente curvado. No es un ave nadadora y al caminar costumbra a levantar la cola.



Polla de agua común
 Common Gallinule
Gallinula galeata

L, TL, JL
 29-33 cm

Plumas blancas en los flancos, pico de punta amarilla con escudo frontal rojo. Al nadar mece la cabeza de adelante hacia atrás.



Gallareta andina
 Slate-colored (Andean) Coot
Fulica ardesiaca

L, TL, JL
 40-46 cm

De color negro pizarra con el pico y escudo variable, pudiendo tener un pico amarillo o pálido y un casco rojo.



Garrapatero de pico estriado
 Groove-billed Ani
Crotophaga sulcirostris

ZA
 28-30 cm

Ave completamente negra con la cola larga y el pico es robusto con marcas de surcos.



Chorlo gritón
 Killdeer
Charadrius vociferus

PY, G
 24-26 cm

Chorlo con collar negro doble en la garganta y patas amarillo pálidas.



Ostrero americano
 American Oystercatcher
Haematopus palliatus

L, PY
 40-44 cm

Ostrero con cabeza negra, manto marrón y plumaje de pecho y vientre blanco. Pico largo y naranja.



Cigüeñuela de cuello negro
 Black-necked Stilt
Himantopus mexicanus

L, PY
 36-41 cm

Patas largas de color rojo que sobresalen de la cola cuando vuela. Emite un sonido parecido al ladrido de un perro pequeño.



Alcaraván huerequeque
 Peruvian Thick-knee
Burhinus superciliosus

ZI
 39-42 cm

Único alcaraván del Perú, color similar a la arena con pico delgado y corto, patas largas y ojos grandes.



Gaviota de capucha gris
 Gray-hooded Gull
Chroicocephalus cirrocephalus

L, PY, G
 41-43 cm

Gaviota blanca con capucha y alas grises, el pico y las patas son naranjas.



Gaviota peruana
 Belcher's (Band-tailed) Gull
Larus belcheri

PY, M
 51-54 cm

Tiene banda negra en la cola, pico amarillo con un anillo subterminal rojo y negro. La cabeza es blanca en época reproductiva.



Gaviota dominicana
 Kelp Gull
Larus dominicanus

PY, M
 56-64 cm

Cola completamente blanca y el pico con una pequeña marca roja en la parte inferior. **Juv.** de color gris pardo, frente clara y pico oscuro.



Piquero peruano
 Peruvian Booby
Sula variegata

M, PY
 71-76 cm


Ave marina blanca con alas y cola oscuras, tiene patas grises.



Cormorán neotropical
 Neotropic Cormorant
Phalacrocorax brasilianus

L, PY
 58-73 cm

Cormorán negro, cuando es juvenil tiene colores más grises y marrones.



Cormorán guanay
 Guanay Cormorant
Phalacrocorax bougainvillii

M, PY
 76 cm

Cormorán con pecho blanco, patas rosadas y un anillo ocular rojo.



Pelícano peruano
 Peruvian Pelican
Pelecanus thagus

M, PY
 152 cm

De gran tamaño y pico característico, con una bolsa elástica en la mandíbula inferior. **Juv.** de color pardusco con vientre blanco.



Mirasol leonado
 Least Bittern
Ixobrychus exilis

TL, L, JL, CD
 28-30.5 cm

Garcita pequeña de colores pardos, corona y escapulares oscuras. Presenta estrías blancas en la garganta.



Huaco común
 Black-crowned Night-Heron
Nycticorax nycticorax

TL, L, JL, CD
 56-61 cm

Adt. Con la corona azul oscuro. **Juv.** Cuerpo pardusco con líneas o manchas blancas. Al volar emite un "gaaoc" de donde proviene su nombre común.